## Lehrgangsprogramm BLS/AED Notfalltraining für Arzi

## BLS/AED Notfalltraining für Arztpraxen



Zielgruppe: Arztpraxen

Kursdauer: 5 UE (zusätzlich bei 5 UE)



Leh	rgangsprograr	nm BLS/AED Notfalltraining für Arztpraxe	en	
Uhr- zeit	Thema	Inhalt	Dauer	
	Begrüßung/ Einführung  BLS Algorithmus	Vorstellung Kursleiter / Teilnehmer Organisatorisches - Kursziel - Notfälle bei Ihnen? - Inhalte - ERC Leitlinien Allg. (ILCOR) - Was bedeutet BLS und AED  Basic-Life-Support   BLS Leilinien (ICOR, ERC, GRC) - Bedeutung des Ersthelfers (die ersten Minuten sind wichtig) - Ursache für Fehler beim einem Notfall (keine Kommunikation, Angst etwas falsch zu machen) - Erste Hilfe (muss ich helfen, was muss ich tun, was ist mir zumutbar) meine Pflicht Erste Hilfe zu leisten Erkennen eines Notfalls - Eigene Sicherheit (Risiken, Gefahren, rechtl. Schutz des Ersthelfers) - Auffinden einer Person (Bewusstlosigkeit = akute Lebensgefahr) - Hilfe holfen (lautes rufen, Personen in der Nähe) - Reaktion prüfen (laut ansprechen und rütteln "shake and shout" - Reagiert (Problem erfragen , ABCDE, Notruf) - Keine Reaktion - Atemwege freimachen (Atemwegsverlegung durch die Zunge bei Bewusstlosigkeit), Kopf überstrecken, Esmarch Handgriff - Atmung prüfen (sehen, hören, fühlen, Atmung richtig einschätzen in nomale und nicht normale oder keine Atmung) - Atmung vorhanden: (Seitenlagerung und Notruf) - Keine normale Atmung: - HLW 30:2: (Herzl-Lungen-Wiederbelebung, 30 - Thoraxkompressionen, 2 Beatmungen mit dem Beatmungsbeutel) - 2 Helfer: Notruf absetzen, Notfallausrüstung besorgen	30 Min.	1 UE
	Thoraxkompression u. Beatmung (praktisch)	Praktisches Üben in 2 er Guppen Thoraxkompression und Beatmung 30 Thoraxkompressione: absolute Priorität im Notfall  Haltung: Mit den Schultern senkrecht über den Brustkorb des betroffenen  Arme durchgestreckt  Druckpunkt: unteres Drittel Sternum, Handballen auflegen  5 – 6 cm tief drücken  Druckfrequenz 100 – 120x/Min.  Be – und Entlastung 1:1  Helferwechsel alle 2 Min. 2 Beatmungen: (mit Beatmungsbeutel und Maske)  Beatmungsbeutel mit Sauerstoff und O2 Reservoir  Atemweg freimachen ( reklinieren/Esmarch Handgriff)  Hilfsmittel ( Güdel, Wendel, Prothesen bei guter Festigkeit belassen)  C Griff /doppel C-Griff  1 Sek. Insuflationszeit/Beatmung  Nicht zuviel Druck ( Magenblähung)	45 Min.	1 UE

Gesamt			5 UE
BLS Algorithmus	<ul><li>Teamtraining (Fallbeispiele)</li><li>Breathing/Debreathing</li></ul>	45 Min. 45 Min.	2 UE
BLS Algorithmus	Teamtraining Kommunikation (Algorithmuskarten)	15 Min.	1
AED (Automatisierter Externer Defibrillator)	<ul> <li>Was bedeutet defibrillieren</li> <li>Einweisung Defibrillator</li> <li>Sicheres defibrillieren</li> <li>Praktisches üben</li> </ul>	30 Min.	. UE